

JETZT NEU BEI ALLERGIEN:

Allegra®

ALLEGRA® SCHMELZTABLETTE FÜR KINDER



**6-11 JAHRE
UND ≥ 20 KG**

**ERSTATTUNGS-
FÄHIG****

Antiallergikum

Lindert allergische
Symptome an:

- Nase
- Augen
- Haut



MACHT NICHT MÜDE*¹

Geeignet für Schulkinder, die tagsüber fit und konzentriert bleiben müssen.



ÜBERZEUGENDES SICHERHEITSPROFIL

Bilastin zeigt in einer Studie mit 260 Kindern < 12 Jahren mit allergischer Rhinitis und Urtikaria ein ähnliches Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil wie Placebo.²



KINDERLEICHTE EINNAHME, ZERGEHT AUF DER ZUNGE

ohne Wasser und mit angenehmem Erdbeergeschmack.

* Nicht-sedierend. Müdigkeit & Schläfrigkeit in klinischen Studien mit vergleichbarer Häufigkeit wie unter Placebo [Leceta et al. 2021, Drugs Context, 10:2021-5-1]. ** OTC-Arzneimittel werden für Kinder bis zum 12. Lebensjahr von der gesetzlichen Krankenversicherung voll erstattet. Für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Wichtig: Rezeptausstellung muss auf rosa/rotem Rezept erfolgen. 1. Fachinformation Allegra® Allergietabletten Kinder 10 mg Schmelztabletten, Stand Mai 2024, A. Nattermann & Cie. GmbH. | 2. Novák Z et al. Pediatr Allergy Immunol. 2016; 27:493-498.

Allegra® Allergietabletten Kinder 10 mg Schmelztabletten **Wirkst.:** Bilastin. Sonst. Bestand.: Mannitol, Mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Simaldtrat, Sucralose, Erdbeer-Aroma (Hauptbestandteile: Maltodextrin, Propylenglycol und Arabisches Gummi), Magnesiumstearat, Hochdisperses Siliciumdioxid. **Anw.-geb.:** Symptomatische Behandlung der allergischen Rhinokonjunktivitis (saisonal und perennial) und Urtikaria bei Kindern von 6 bis 11 Jahren mit einem Körpergewicht von mindestens 20 kg. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen einen Inhaltsstoff. **Nebenw.:** Überempfindlichkeitsreaktionen wie Anaphylaxie, Angioödem, Dyspnoe, Hautausschlag, lokalisiertes Ödem/lokale Schwellung, Lippenschwellung, Erythem, Pruritus, Ekzem, Urtikaria, allergische Konjunktivitis, Rhinitis, Kopfschmerzen, (Ober-) Bauchschmerzen, Augenreizung, Schwindel, Verlust des Bewusstseins, Durchfall, Übelkeit, Ermüdung. Weitere Nebenwirkungen die bei Jugendlichen und Erwachsenen auftreten können: Somnolenz; trockene Nasenschleimhaut; oraler Herpes; Appetitsteigerung; Angst; Schlaflosigkeit; Ermüdung; Asthenie; Tinnitus; Vertigo; Sinusarrhythmie; Palpitationen; Tachykardie; Rechtsschenkelblock; EKG Anomalien, einschl. QT-Verlängerung; Magenbeschwerden wie Erbrechen, Dyspepsie, Gastritis, Mundtrockenheit; Durst; Vorerkrankung gebessert; Fieber; erhöhtes Gewicht; erhöhte Leber-, Nieren-, Triglyceridwerte.

Apothekenpflichtig. A. Nattermann & Cie. GmbH, Brüningstraße 50, 65929 Frankfurt am Main. **Stand:** Mai 2024.

Allegra® Allergietabletten 20 mg Tabletten **Allegra®** Allergietabletten 20 mg Schmelztabletten. **Wirkst.:** Bilastin. Sonst. Bestand.: Tabletten: Mannitol, Mikrokristalline Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Simaldtrat, Magnesiumstearat, Hochdisperses Siliciumdioxid. Schmelztabletten: Mannitol, Mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Simaldtrat, Sucralose, Erdbeer-Aroma (Hauptbestandteile: Maltodextrin, Propylenglycol und Arabisches Gummi), Magnesiumstearat, Hochdisperses Siliciumdioxid. **Anw.-geb.:** Symptomatische Behandlung der allergischen Rhinokonjunktivitis (saisonal und perennial) bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen einen Inhaltsstoff. **Nebenw.:** Kopfschmerzen; Somnolenz; Überempfindlichkeitsreaktionen wie Anaphylaxie, Angioödem, Dyspnoe, Hautausschlag, lokalisiertes Ödem/lokale Schwellung, Erythem, Pruritus; trockene Nasenschleimhaut; oraler Herpes; Appetitsteigerung; Angst; Schlaflosigkeit; Ermüdung; Asthenie; Schwindelgefühl; Tinnitus; Vertigo; Sinusarrhythmie; Palpitationen; Tachykardie; Rechtsschenkelblock; EKG Anomalien, einschl. QT-Verlängerung; Bauchschmerzen; Magenbeschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Dyspepsie, Gastritis, Diarrhö; Mundtrockenheit; Durst; Vorerkrankung gebessert; Fieber; erhöhtes Gewicht; erhöhte Leber-, Nieren-, Triglyceridwerte.

Apothekenpflichtig. A. Nattermann & Cie. GmbH, Brüningstraße 50, 65929 Frankfurt am Main. **Stand:** Tabletten: Dezember 2022, Schmelztabletten: März 2024.

ALLEGRA® MIT BILASTIN –

JÜNGSTES ANTIHISTAMINIKUM IN DER SELBSTMEDIKATION

ZUR SYMPTOMATISCHEN BEHANDLUNG DER ALLERGISCHEN RHINOKONJUNKTIVITIS (SAISONAL UND PERENNIAL) UND URTIKARIA



**Allegra® Allergietabletten Kinder
10 mg Schmelztabletten**



**Allegra® Allergietabletten
20 mg Schmelztabletten**



**Allegra® Allergietabletten
20 mg Tabletten**

Wirkstoff	10 mg Bilastin	20 mg Bilastin	20 mg Bilastin
Alter	6–11 Jahre & ≥ 20 kg	Ab 12 Jahren	Ab 12 Jahren
Darreichungsform	Schmelztabletten	Schmelztabletten	Filmtabletten
Geschmack	Erdbeeraroma	Erdbeeraroma	Aromafrei
Einnahme	1x täglich ohne Wasser, zergehen auf der Zunge	1x täglich ohne Wasser, zergehen auf der Zunge	1x täglich mit Wasser
Packungsgrößen und Preise	6er (PZN: 18878878) AVP 5,63 € 20er (PZN: 18878884) AVP 13,17 €	6er (PZN: 18878890) AVP 5,88 € 20er (PZN: 18878909) AVP 13,76 €	6er (PZN: 18181918) AVP 5,22 € 20er (PZN: 18113489) AVP 12,20 € 50er (PZN: 18113578) AVP 27,74 € 100er (PZN: 18887647) AVP 50,97 €

Gut zu wissen: Tagestherapiekosten günstiger als gängige Cetirizin Säfte & Tropfen.

FREI VON:



Alkohol



Laktose



Zucker



Gluten



Titandioxid



tierischen Bestandteilen