

Kamistad® Gel

Kamistad® Baby

Kamistad® Mundspray

Kamistad® Mundspülung

Bei **Schmerzen, Reizungen und Entzündungen** im Mundraum

Zur **Massage des Zahnfleisches** bei **zahnenden Kindern**

Beruhigendes **Mundspray** für die gezielte Pflege schwer zugänglicher Stellen

NEU: Die **sanfte Mundspülung** mit 0,1% Chlorhexidin und der Kraft der Kamille



- Schnelle Schmerzlinderung dank Lidocain
- Hemmt die Entzündung durch die Kamille
- Fördert die natürliche Heilung

- Beruhigt das empfindliche Zahnfleisch
- Kühlt die Durchbruchstelle des Zahns
- Pflegt die sensible Mundschleimhaut
- Ohne Alkohol
- Ohne Zucker

- Beruhigt das empfindliche Zahnfleisch
- Hygienische Anwendung für unterwegs
- Handliches Format, das in jede Tasche passt

- Pflegt und stärkt das Zahnfleisch
- Hemmt die Plaquebildung
- Bekämpft Bakterien
- Mit Minz-Geschmack
- Ohne Alkohol

Arzneimittel

Kosmetikum

Kosmetikum

Kosmetikum

Kamistad® Gel 20mg Lidocain-HCl/185mg Auszug aus Kamillenblüten/1g Gel zur Anwendung in der Mundhöhle. Wirkstoffe: Lidocainhydrochlorid und Auszug aus Kamillenblüten. **Zus.:** 1 g Gel enth. 20mg Lidocainhydrochlorid 1H2O u. 185mg Auszug aus Kamillenblüten (1:4-5). **Auszugsm.:** Ethanol 50% (V/V) mit 1,37% Trometamol (eingestellt m. Methansäure 98% auf pH 7,3). **Sonst. Bestandt.:** Benzalkoniumchlorid, Ethanol 96%, Methansäure, Polyacrylsäure, Saccharin-Na, Trometamol, gerein. Wasser, Wasser, Zimtöl. **Anw.:** Traditionell angew. als mild wirkendes AM b. leichten Entzünd. d. Zahnfleisches u. d. Mundschleimhaut. **Gegenanz.:** Überempf. gg. d. Wirkstoffe, and. Lokalanästhetika v. Amid-Typ, Kamille u. and. Korbblütler, Zimt (Zimtaldehyd), Perubalsam od. e. d. sonst. Bestandt. **Schwangersch. /Stillz.:** Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg. **NW:** Vorübergeh. leichtes Brennen; Aufgr. d. Gehaltes an Lidocain, Zimt u. Kamille können allerg. Reakt. auftr. (z.B. Kontaktallergie), auch b. Überempf. gg. Korbblütler (z.B. Beifuß) u. Perubalsam (sog. Kreuzreakt.); Zimt (Zimtaldehyd) kann Hautreiz. hervorrufen; Überempf.reakt. an Haut u. Schleimhäuten. **Warnhinw.:** Enthält Benzalkoniumchlorid u. Zimt (Zimtaldehyd). **Hinw.:** Bei fehlender Besserung d. Entzündungszeichen innerhalb 1 Wo. sowie beim Auftr. unklarer Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Angaben gekürzt – weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. **STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel Stand: August 2020**