

PTA IN LOVE

**ALLERGIEN?**

**LASS DICH NICHT STOPPEN!**

**ALLEGRA®  
MACHT NICHT MÜDER¹  
KEINER IST SCHNELLER²**

**BILASTIN 20 mg**

**Allegra®**

Allergietabletten



**20 TABLETTE**

**Antiallergikum**

Lindert allergische  
Symptome an:

- Nase
- Augen
- Haut

**MEIST EMPFOHLENE  
ALLERGIEMARKE  
UNTER PTAS  
2023³**



## ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE FÜR ALLEGRA®



**Macht nicht müder<sup>1</sup>**

Der Traum aller Allergiker\*innen: ein Antihistaminikum, das **Symptome lindert**, ohne müde zu machen. Allegra® macht's möglich!



**Keiner ist schneller<sup>2</sup>**

**Schnelle Hilfe bei Allergien und Urtikaria** kann Deinen Kund\*innen den Tag retten! Heuschnupfen oder Juckreiz? Nicht mit uns!



**24 Stunden wirksam**

Als Apotheken-Superheld\*in weißt Du ganz genau: Ein Tag hat oft vollgepackte **24 Stunden**. Umso angenehmer, dass Betroffene mit nur **einer Allergietablette täglich** ihre Symptome wirksam kontrollieren können.



**Sichere Empfehlung**

Mit Allegra® sind Du und Deine Kund\*innen stets gut beraten: keine Dosisanpassungen bei Leber- oder Niereninsuffizienz, keine Metabolisierung, keine CYP-Interaktion.<sup>4</sup>

1. Müdigkeit und Schläfrigkeit in Studien mit vergleichbarer Häufigkeit wie unter Placebo | 2. Unter oralen Antihistaminika. Wirkt bei bestimmungsgemäßer Anwendung i. d. R. nach 30-60 Min., wie die meisten oralen Antihistaminika | 3. Jede\*r dritte PTA empfiehlt Allegra® als erste Wahl. Ipsos 23-000660 Recommendation Tracking Pharmacy Allergy Q3/2023 (Onlinebefragung von n=78 PTAs, Befragungszeitraum 26.07.-10.08.2023) | 4. Fachinformation Allegra® Allergietabletten

**Allegra®** Allergietabletten 20 mg Tabletten. **Wirkst.:** Bilastin. Sonst. Bestandt.: Mannitol, Mikrokristalline Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Simaldrat, Magnesiumstearat, Hochdisperses Siliciumdioxid. **Anw.-geb.:** Symptomatische Behandlung der allergischen Rhinokonjunktivitis (saisonal und perennial) und Urtikaria bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen einen Inhaltsstoff. **Nebenw.:** Kopfschmerzen; Somnolenz; Überempfindlichkeitsreaktionen wie Anaphylaxie, Angioödem, Dyspnoe, Hautausschlag, lokalisieretes Ödem/lokale Schwellung, Erythem, Pruritus; Nasenbeschwerden; trockene Nasenschleimhaut; oraler Herpes; Appetitsteigerung; Angst; Schlaflosigkeit; Ermüdung; Asthenie; Schwindelgefühl; Tinnitus; Vertigo; Sinusarrhythmie; Palpitationen; Tachykardie; Rechtsschenkelblock; EKG Anomalien, einschl. QT-Verlängerung; Bauchschmerzen; Magenbeschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Dyspepsie, Gastritis; Diarrhö; Mundtrockenheit; Durst; Vorerkrankung gebessert; Fieber; erhöhtes Gewicht; erhöhte Leber-, Nieren-, Triglyceridwerte. **Apothekenpflichtig. A. Nattermann & Cie. GmbH**, Brünningstraße 50, 65929 Frankfurt am Main. **Stand:** Dezember 2022