

Silomat® Hustenlöser Ambroxolhydrochlorid 30 mg/5 ml Sirup

Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid.

Zus.: 5 ml Sirup enth. 30 mg Ambroxolhydrochlorid. 1 ml Sirup enth. 6 mg Ambroxolhydrochlorid.

Sonst. Bestandt.: Hyetellose, Sorbitol-Lsg. 70% (nicht kristallis.) (E420), Glycerol (85%) (E422), Benzoessäure (E210), Acesulfam-K, Erdbeeraroma (Propylenglycol [E1520], Glycerol, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-on, Ethyllactat, Methylcinnamat, Buttersäure, Pentansäure, Hexansäure, Butan-2,3-dion), Vanillearoma (Ammonsulfit-Zuckerulör [E150d], Propylenglycol), gerein. Wasser.

Anw.: Mukolyt. Therapie b. bronchopulmon. Erkrank. m. gestört. Schleimbildung u. -transport b. Erw., Jugendl. u. Kdr. ab 2 J.

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.; Kdr. unter 2 J.

Schwangersch./Stillz.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

NW: Überempf.reakt.; anaphylakt. Reakt. einschl. anaphylakt. Schock, Angioöd., Juckreiz; Dysgeusie (z.B. Veränd. d. Geschmacksempfind.), pharyng. Hypästhesie, Dyspnoe (als Sympt. e. Überempf.reakt.), Übelk., Taubh.gefühl i. Mund, Erbr., Diarrhö, Dyspepsie, Bauchschm., Mundtrockenh., Trockenh. i. Hals, Siallorrhö, Hautausschlag, Urtik., schwere Hautreakt. (einschl. Eryth. multif., SJS, TEN, AGEP), Fieber, Schleimhautreakt.

Warnhinw.: Enth. Sorbitol u. Benzoessäure.

Angaben gekürzt - weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation.

STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

Stand: August 2023

Silomat® Hustenstiller Dextromethorphan mit Zitronen-Geschmack 7,7 mg Lutschpastillen

Silomat® Hustenstiller Dextromethorphan mit Honig-Geschmack 7,7 mg Lutschpastillen

Wirkstoff: Dextromethorphanhydrobromid-Monohydrat.

Zus.: 1 Lutschpastille enth. 10,5 mg Dextromethorphanhydrobromid-Monohydrat (entsprech. 7,7 mg Dextromethorphan). **Sonst. Bestandt.:** Betadex, Arab. Gummi, Saccharin-Na, Honigaroma; Citronensäure, dünnflüss. Paraffin, gerein. Wasser; *zusätzl. f. -Zitronen-Geschmack:* Na-cyclamat, Chinolingelb (E104), Zitronenaroma, Levomenthol, Maltitol; *zusätzl. f. -Honig-Geschmack:* Honig, Maltitol-Lsg., Waldbeeraroma.

Anw.: Symptom. Behandl. d. Reizhustens (unprodukt. Husten); Anw. b. Kdr. ab 6 J. u. Erw.

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst., Levomenthol (*nur f. -Zitronen-Geschmack*) od. e. d. sonst. Bestandt.; gleichzeitig. Behandl. m. MAO-Hemmern od. Anw. v. MAO-Hemmern i. d. letzt. 2 Wo.; Asthma bronch.; chron. obstrukt. Atemwegserkrank.; Pneumonie; Ateminsuff.; Atemdepress.; Stillz.; Kdr. unter 6 J.; selt. angebor. Unverträglichk. gg. e. d. Bestandt.

Schwangersch.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

Stillz.: Kontraind.

NW: Überempf.reakt., einschl. anaphylakt. Reakt., Angioöd., Bronchospasmus, Urtik., Prur., Exanthem u. Erythem; Halluzinat., Entwickl. e. Abhängigk. (b. Missbrauch), Verwirrth., Schwindelgefühl, Somnol., Vertigo, undeutl. Aussprache u. Nystagmus, Dystonie, Fatigue, fixes AM-Exanthem, Übelk., Magen-Darm-Beschwerden, Erbr., Obstipat.; *zusätzl. f. -Zitronen-Geschmack:* Levomenthol: Überempf.reakt. (einschl. Atemnot).

Warnhinw.: Enth. Maltitol, Cyclodextrin(e); *zusätzl. f. -Zitronen-Geschmack:* Levomenthol; *zusätzl. f. -Honig-Geschmack:* Enth. Invertzucker (aus Honig). *Hinw.:* Nicht mehr u. nicht länger anw. als empfohlen.

Beeintr. d. Reakt.sverm. mögl.! Angaben gekürzt - weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation.

STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Stand: Januar 2024

Silomat® Hustenstiller Dextromethorphan Intensiv 22 mg Hartkapseln

Wirkstoff: Dextromethorphanhydrobromid-Monohydrat.

Zus.: 1 Hartkps. enth. 30 mg Dextromethorphanhydrobromid-Monohydrat (entsprech. 22 mg Dextromethorphan). **Sonst. Bestandt.:** Mikrokrist. Cellulose, Lactose-Monohydrat, Mg-stearat, Gelatine, Titandioxid (E171).

Anw.: Symptom. Behandl. d. Reizhustens (unprodukt. Husten); Anw. b. Erw. u. Jugendl. ab 12 J.

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestandt.; gleichzeit. Behandl. m. MAO-Hemmern od. Anw. v. MAO-Hemmern i. d. letzt. 2 Wo.; Asthma bronch.; chron. obstrukt. Atemwegserkrank.; Pneumonie; Ateminsuff.; Atemdepress.; Stillz.; selt. angebor. Unverträglichk. gg. e. d. Bestandt.

Schwangersch.: Nur nach sorgfält. Nutzen-Risiko-Abwäg.

Stillz.: Kontraind.

NW: Überempf.reakt., einschl. anaphylakt. Reakt., Angioöd., Bronchospasmus, Urtikaria, Pruritus, Exanthem u. Erythem; Halluzinat., b. Missbrauch Entwickl. e. Abhängigk., Verwirrth., Schwindelgefühl, Somnol., Vertigo, undeutl. Aussprache u. Nystagmus, Dystonie, Fatigue, fixes AM-Exanthem, Übelk., Magen-Darm-Beschwerden, Erbrechen, Obstipat.

Warnhinw.: Enth. Lactose. *Hinw.:* Nicht mehr u. nicht länger einnehmen als empfohlen.

Beeintr. d. Reakt.sverm. mögl.! Angaben gekürzt - weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation.

STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Stand: August 2023

Pflichtangaben für Fachkreise

Silomat® Hustenstiller Pentoxyverin 1,35 mg/ml Saft, Lösung zum Einnehmen

Silomat® Hustenstiller Pentoxyverin 19 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung

Wirkstoff: Pentoxyverincitrat.

Zus.: *-Saft:* 1 ml Lsg. z. Einnehm. enth. 2,13 mg (entsprech. 1,35 mg Pentoxyverin); *-Tropfen:* 1 ml Lsg. (34 Tropf.) 30 mg Pentoxyverincitrat (entsprech. 19 mg Pentoxyverin). **Sonst. Bestandt.:** Propylenglycol (E1520), Saccharin-Na (E954), gerein. Wasser; *zusätzl. f. -Saft:* Citronensäure-Monohydrat (E330), Na-citrat 2 H₂O (E331), Glycerol 85% (E422), Sorbitol-Lsg. 70% (nicht kristall.) (E420), Methyl-4-hydroxybenzoat (E218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E216), Birnen-Aroma, Gin-Aroma (enth. Benzylalkohol); *zusätzl. f. -Tropfen:* Milch-Aroma.

Anw.: Symptomat. Behandl. d. Reizhustens; Anw. b. Erw. u. Kdr. ab 2 J.

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst. (*nur f. -Saft:* Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat, Benzylalkohol) od. e. d. sonst. Bestandt.; Ateminsuff. od. ZNS-Depress.; Leberinsuff.; Schwangersch.; Stillz; Kdr. i. d. ersten zwei Lebensjahren.

Schwangersch./Stillz.: Kontraind.

NW: Somnol., Krampfanfälle, Dyspnoe (meist. i. Zusammenh. m. allerg. Reakt.), Atemdepress., Oberbauchschm., Diarrhö, Übelk., Erbrechen., angioneurot. Öd., Urtik., Exanthem, Fatigue, Überempf.reakt. bis hin z. anaphylakt. Reakt.; *zusätzl. f. -Saft:* Methyl-/Propyl-4-hydroxybenzoat: Überempf.reakt., auch Spätreakt.; Benzylalkohol: allerg. Reakt.

Warnhinw.: Enth. Propylenglycol; *zusätzl. f. -Saft:* Methyl- u. Propyl-4-hydroxybenzoat, Sorbitol, Benzylalkohol u. Natrium.

Beeintr. d. Reakt.verm. mögl.! Angaben gekürzt - weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation.

STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Stand: Juli 2024/ Mai 2023

Pflichtangaben für Fachkreise

Silomat® Hustenstiller Pentoxyverin 1,35 mg/ml Saft, Lösung zum Einnehmen

Silomat® Hustenstiller Pentoxyverin 19 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung

Wirkstoff: Pentoxyverincitrat.

Zus.: -*Saft*: 1 ml Lsg. z. Einnehm. enth. 2,13 mg (entsprech. 1,35 mg Pentoxyverin); -*Tropfen*: 1 ml Lsg. (34 Tropf.) 30 mg Pentoxyverincitrat (entsprech. 19 mg Pentoxyverin). **Sonst. Bestandt.:** Propylenglycol (E1520), Saccharin-Na (E954), gerein. Wasser; *zusätzl. f. -Saft*: Citronensäure-Monohydrat (E330), Na-citrat 2 H₂O (E331), Glycerol 85% (E422), Sorbitol-Lsg. 70% (nicht kristall.) (E420), Methyl-4-hydroxybenzoat (E218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E216), Birnen-Aroma, Gin-Aroma (enth. Benzylalkohol); *zusätzl. f. -Tropfen*: Milch-Aroma.

Anw.: Symptomat. Behandl. d. Reizhustens; Anw. b. Erw. u. Kdr. ab 2 J.

Gegenanz.: Überempf. gg. d. Wirkst. (*nur f. -Saft*: Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat, Benzylalkohol) od. e. d. sonst. Bestandt.; Ateminsuff. od. ZNS-Depress.; Leberinsuff.; Schwangersch.; Stillz; Kdr. i. d. ersten zwei Lebensjahren.

Schwangersch./Stillz.: Kontraind.

NW: Somnol., Krampfanfälle, Dyspnoe (meist. i. Zusammenh. m. allerg. Reakt.), Atemdepress., Oberbauchschm., Diarrhö, Übelk., Erbrechen, angioneurot. Öd., Urtik., Exanthem, Fatigue, Überempf.reakt. bis hin z. anaphylakt. Reakt.; *zusätzl. f. -Saft*: Methyl-/Propyl-4-hydroxybenzoat: Überempf.reakt., auch Spätreakt.; Benzylalkohol: allerg. Reakt.

Warnhinw.: Enth. Propylenglycol; *zusätzl. f. -Saft*: Methyl- u. Propyl-4-hydroxybenzoat, Sorbitol, Benzylalkohol u. Natrium.

Beeintr. d. Reakt.verm. mögl.! Angaben gekürzt - weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation.

STADA Consumer Health Deutschland GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Stand: Juli 2024/ Mai 2023